

## 中国溜芒蝇属三新种

(双翅目: 蝇科)

薛万琦

冯炎

(沈阳师范学院昆虫研究所 沈阳 110034) (四川雅安地区卫生防疫站 雅安 625000)

刘铭泉

(广东省湛江市卫生防疫站 湛江 524037)

**摘要** 本文报道来自四川省雅安地区和浙江省百山祖地区的蝇科溜芒蝇属 3 新种, 分别命名为伴斧溜芒蝇 *Caricea securisocialis* sp. nov.、曲膜溜芒蝇 *Caricea curvivesica* sp. nov. 和小钩溜芒蝇 *Caricea paulihamata* sp. nov.。模式标本保存于沈阳师范学院昆虫研究所。

**关键词** 双翅目, 蝇科, 溜芒蝇属, 新种

**中图分类号** Q969.453.8

1 伴斧溜芒蝇, 新种 *Caricea securisocialis* sp. nov. (图 1—5)

雄蝇 体长 3.7 mm, 翅长 3.9 mm。额为头宽 0.4 倍, 前方稍变狭; 间额暗褐色, 前方黄色, 间额宽为侧额的 2.5 倍, 额三角粉被灰黄色, 前方靠近额前缘; 单眼鬃稍短于内顶鬃长, 亦稍短于额宽, 外顶鬃长于后顶鬃, 为内顶鬃长的 1/2; 侧额粉被黄灰色, 后倾上眶鬃 2, 略等长或强, 内倾下眶鬃 2, 上方为下方一根长的 3/5, 前额具 2 根小毛; 侧额粉被黄色, 约为触角宽的 2/3, 触角除第 3 节的端半部暗褐色外, 其余均为黄色, 第 3 节为第 2 节长的 2.2 倍, 芒基半部具短纤毛, 纤毛长均不超过芒基宽; 髯角位于额角之后; 颊和后头粉被淡灰色, 颊高为眼高 1/8 强, 下颏须黄色, 前颊略发亮; 复眼下后缘不凹入。胸部黑色, 盾片的粉被灰至棕灰色, 无斑条; 中鬃呈 2 列刚毛状, 背中鬃 2+3, 第 1 前背中鬃为第 2 根长的 3/5, 翅内鬃 0+2, 小盾端鬃和基鬃均发达, 前侧片鬃和前气门鬃各 2, 腹侧片鬃呈三角形排列。翅淡棕色, 前缘刺很短小, *r-m* 和 *m-m* 横脉附近具暗晕; 腋瓣淡黄至白色, 下腋瓣为上腋瓣长的 1.6 倍; 平衡棒黄色。各足基节、前股(除端部外)、后股(除基部外)、中股腹面和中部背面暗黑色, 其余各部均为黄色; 前胫无中位后腹鬃; 中股前腹鬃列呈刚毛状, 中位前鬃 1, 基半部具 2—3 根稍长的后腹鬃, 端位后背鬃 2, 中胫中位后背鬃 1; 后股前腹鬃列参差, 中位 1 根和近端位 2 根长大, 亚基位 1 根较小, 基位 1 根呈粗刚毛状, 其余为刚毛状, 中部 2 根后腹鬃长大, 亚基位 1 根短小, 基位 1 根和近端部 2—3 根后腹鬃均为刚毛状, 端位后背鬃 1, 后胫亚中

本文 1996-10-22 收到, 1996-12-09 修回

位前腹鬃 1, 中位和亚基位前腹鬃各 1, 中位和亚基位的后腹鬃各 1, 近端位背鬃 1; 各足爪及爪垫长大, 分别长于各第 4 分跗节长。腹部大部黑色, 第 1+2 合背板腹面和侧面黄色, 第 3 背板后缘和第 4 背板侧后缘黄色, 第 3 到 5 背板各具 1 对褐色斑, 正中具暗褐色狭条; 第 1 腹板裸, 第 5 腹板侧叶基部外缘赘叶向内方伸延。

雌蝇 不详。

正模 ♂, 四川雅安金凤山, 860 m, 1987 年 11 月 30 日, 冯炎采。新种近似斧叶溜芒蝇 *Caricea secura* (Ma, 1981), 但新种雄触角芒具短纤毛, 纤毛长不超过芒基宽; 盾片无斑条; *r-m* 和 *m-m* 横脉附近具暗晕; 腹部各背板具正中条; 侧尾叶较细长, 末端无爪状突。





图 1—5 伴斧溜芒蝇 *Caricea securisocialis* sp. nov. (♂)

1. 腹部背面(abdomen in dorsal view); 2. 第5腹板侧腹面(5th sternite in lateroventral view); 3. 尾器侧面(terminalia in lateral view); 4. 阳体侧面(phallosome in lateral view); 5. 肛尾叶后面(cerci in posterior view)。

## 2 曲膜溜芒蝇, 新种 *Caricea curvivesica* sp. nov. (图 6—11)

雄蝇 体长和翅长约为 4.2 mm。额宽约为头宽 0.4 倍, 额下方稍宽, 间额黑褐色, 为侧额宽的 2.5 倍; 额三角较宽, 达额前缘, 粉被黄灰色; 单眼鬃长大, 长于额宽; 外顶鬃稍长于后顶鬃, 为内顶鬃长的  $2/5$ ; 侧额和侧颜粉被黄至黄灰色; 后倾上眶鬃 2, 下方一根较大, 下眶鬃 2, 内倾, 上方为下方一根长的  $1/2$ , 前额具 1—2 根小毛; 侧颜约为

图 6—11 曲膜溜芒蝇 *Caricea curvivesica* sp. nov. (♂)

6. 腹部背面(abdomen in dorsal view); 7. 第5腹板腹面(5th sternite in ventral view); 8. 第5腹板侧面(5th sternite in lateral view); 9. 尾器侧面(terminalia in lateral view); 10. 外生殖器侧面(genitalia in lateral view); 11. 肛尾叶后面(cerci in posterior view)。

触角宽的  $2/5$ ; 触角除第3节端半部淡褐色外, 其余黄色, 第3节长为宽的  $2.5$  倍, 为第2节长的  $2.2$  倍, 芒基半部呈羽状, 最长芒毛长约等于触角宽; 颊和后头粉被淡灰色, 颊高为眼高  $1/15$ ; 髭角位于额角之后; 下颏须黄色, 稍长于暗褐色的前颏; 复眼后下缘不回入。胸部黑色, 背面粉被棕灰色, 侧面粉被淡灰色, 盾片无斑条; 中鬃呈2列刚毛状, 背中鬃  $2+3$ , 第1前背中鬃为第2根长的  $3/5$ , 翅内鬃  $0+2$ ; 小盾基鬃和端鬃均长大; 前侧片鬃和前气门鬃各2, 腹侧片鬃呈三角形排列; 后气门棕色。翅透明, 脉淡褐色, 前缘刺约等于  $r-m$  横脉长; 腋瓣淡黄色, 下腋瓣长为上腋瓣长的  $1.5$  倍; 平衡棒黄色。中足和后足基节及前股背面褐色, 其余各部均黄; 前胫无中位后腹鬃, 中股前腹刚毛列往基部去的刚毛稍长, 约等于胫节横径, 近中位前鬃1, 近端位后背鬃2, 基部  $2/5$  具2根长大

后腹鬃, 中脛中位后背鬃 1; 后股前腹鬃列稀疏, 约 5 根明显, 基位和中位后腹鬃短小, 亚基位后腹鬃长大, 近端位后腹鬃最小, 后脛中位前腹鬃 1, 中位和亚基位前背鬃及后背鬃各 1, 近端位背鬃 1; 各足爪长大, 长于第 4 分跗节长。腹部筒形, 末端稍向腹面膨胀, 第 5 腹板侧叶长大, 达尾末端; 前 4 个背板后缘和前 4 个腹板黄色, 其余暗黑色; 第 3 至 5 背板各具 1 对褐色斑, 正中暗褐色条明显; 肛尾叶基半部鬃长大, 阳体膜状突侧面观呈直角弯曲。

雌蝇 体长和翅长约为 4.8 mm。盾片略具 3 条褐色条; 爪垫略短小, 近圆形; 其他外形特征同雄蝇。

正模 ♂, 四川雅安金凤山, 680 m, 1986 年 12 月 5 日; 副模, 1 ♀, 同地同次捕获, 冯炎采。

新种近似 *Caricea mikii* (Strobl, 1893), 但新种触角芒毛较长, 长约等于触角宽度; 前缘刺长大, 长约等于 *r-m* 横脉长; 雄肛尾叶后面观端半部狭长等不同。

### 3 小钩溜芒蝇, 新种 *Caricea paulihamata* sp. nov. (图 12—14)



图 12—14 小钩溜芒蝇 *Caricea paulihamata* sp. nov. (♂)

12. 第5腹板侧腹面(5th sternite in lateroventral view); 13. 尾器侧面(terminalia in lateral view);  
14. 尾器后面(terminalia in posterior view)。

雄蝇 体长 3.2 mm, 翅长 3.0 mm。额宽为头宽的 0.35 倍, 往头顶去稍变狭, 间额黑色, 粉被疏少, 额三角粉被灰黄色, 达额前缘, 间额为一侧额宽的 3 倍, 单眼鬃长约等于额上部宽度, 外顶鬃为内顶鬃长的  $1/2$ ; 上眶鬃和下眶鬃各 2, 下方 1 根均粗大, 2 根上眶鬃间距为下眶鬃间距的 2 倍, 前额具 3—4 根小毛; 侧额、侧颜和颊的粉被灰色, 侧颜中部宽约为触角宽的  $1/3$ ; 触角全黄, 第 3 节为第 2 节长的 2.5 倍, 芒基部  $2/5$  呈短纤毛状, 端部  $3/5$  裸, 最长芒毛长稍超过芒基宽; 口上片不突出, 髯角位于额角之后, 颊高为复眼高  $1/15$ , 复眼后下缘不凹入, 后头背区具刚毛; 前颏短, 下颏须淡黄色, 细长。胸部黑色, 粉被灰色, 盾片无斑条; 中鬃呈刚毛状, 背中鬃 2+3, 第 1 前背中鬃为第

2 根长的 3/5; 翅内鬃 0+2, 小盾端鬃和基鬃均发达, 前侧片鬃和前气门鬃各 2; 腹侧片鬃 3, 呈三角形排列。翅透明, 脉淡棕色, 前缘基鬃黄色, 前缘刺短小; 平衡棒黄色; 腋瓣淡黄色, 下腋瓣为上腋瓣长的 1.3 倍。中足和后足基节褐色, 足其余各节均黄, 各足爪及爪垫短小; 前胫无中位后腹鬃; 中股前腹鬃呈刚毛状, 仅基部几根稍明显, 基半部具 1 前刚毛列, 中位前鬃 1, 端位后背鬃 2, 基部 1/3 具 2—3 根长的后腹鬃, 中胫中位后背鬃 1; 后股前腹鬃列参差不等, 近中位后腹鬃较长, 亚基位后腹鬃较短, 后胫亚中位前腹鬃 1, 前背鬃和后背鬃各 2, 近端位背鬃 1。腹部背面观呈卵形; 第 1 至 3 背板侧面、第 4 背板腹缘和第 1 至 4 腹板黄色, 第 1+2 合背板背面褐色, 其余各部均暗, 第 3 至 5 背板各具 1 对黑斑, 无正中条, 粉被灰色; 第 5 背板心鬃和后缘鬃发达, 第 7、8 合背板具 1 对缘鬃; 第 1 腹板裸。

雌蝇 不详。

正模 ♂, 浙江庆元百山祖, 1100 m, 1994 年 4 月 20 日, 吴鸿采。

新种外形主要特征近似钝叶溜芒蝇 *Caricea mikii* (Strobl, 1893), 但前者雄性肛尾叶后面观端半部狭, 侧尾叶细长, 端部具钩等不同。

致谢 吴鸿同志采集并赠送标本, 特致谢忱。

## 参 考 文 献

- 马忠余, 1981. 辽宁蝇科五新种记述 (双翅目: 蝇科). 动物分类学报, 6(3): 300—307.  
 薛万琦, 1981. 辽宁省溜芒蝇属一新种 (双翅目: 蝇科). 动物分类学报, 6(2): 182—183.  
 Hennig W, 1961. Die fliegen der Palaearktischen Region 7(2): 481—491

## THREE NEW SPECIES OF THE GENUS *Caricea* FROM CHINA

(Diptera: Muscidae)

XUE Wan-qi

(Institute of Entomology, Shenyang Normal College, Shenyang 110034)

FENG Yan

(Hygienic and Anti-epidemic Station of Ya'an Prefecture, Sichuan Province, Ya'an 625000)

LIU Ming-quan

(Zhanjiang Hygienic and Anti-epidemic Station, Zhanjiang 524037)

## Abstract

In this paper, three new species of *Caricea* from Sichuan and Zhejiang Provinces are described. The type specimens are deposited in the Institute of Entomology, Shenyang Normal College.

### 1 *Caricea securisocialis* sp. nov. (Figs. 1-5)

This new species is similar to *Caricea secura* (Ma, 1981) in male terminalia, but can be distinguished from the latter in arista short-haired, longest hair shorter than the basal diameter; scutum without vitta; near *r-m* and *m-m* cross veins with cloud; median brown vitta on tergites of abdomen more evident; surstylus longer, without unguiform at apex.

Holotype ♂, Mt. Jinfeng, Ya'an, Sichuan Province, 102° 56' E, 29° 59' N, 860 m, 30-XI-1987, collected by Feng Yan.

### 2 *Caricea curvivesica* sp. nov. (Figs. 6-11)

This new species is allied to *Caricea mikii* (Strobl, 1893), but differs from the latter by: arista plumose, costal spine about as long as *r-m* cross vein; distal half of cerci of male slender in posterior view.

Holotype ♂, Mt. Jinfeng, Ya'an, Sichuan Province, 102° 56' E, 29° 59' N, 866 m, 5-XII-1986; paratype 1 ♀, data same as holotype, collected by Feng Yan.

### 3 *Caricea paulihamata* sp. nov. (Figs. 12-14)

This new species is very similar to *Caricea mikii* (Strobl, 1893), but differs from the latter in having rather narrow distal half of the cerci in posterior view; surstylus slender and with hook at apex.

Holotype ♂, Mt. Baishanzu, Zhejiang Province, 1100 m, 20-IV-1994, collected by Wu Hong.

**Key words** Diptera, Muscidae, *Caricea*, New species